

A látásszűrés optimális (nemzetközileg kialakított) időpontjai:


- 28 hónap - fejlődési rendellenesség, kancsalság, tompalátóság, hypermetropia, anisometropia
- 4 év - kancsalság, tompalátóság, anisometropia hypermetropia, myopia
- 6 év - kancsalság, tompalátóság, anisometropia hypermetropia, myopia
- 9 év - hypermetropia korrekció-, amblyopia kontroll, myopia
- 11 év - hypermetropia korrekció-, amblyopia kontroll, myopia, színlátás
- 16 év - myopia, színlátás

A látásszűrés optimális időpontjai Magyarországon:

- 28 hónap - fejlődési rendellenesség, kancsalság, tompalátóság, hypermetropia, anisometropia

- 4 év - kancsalság, tompalátóság, anisometropia hypermetropia, myopia
- 6 év - kancsalság, tompalátóság, anisometropia hypermetropia, myopia
- 9 év - hypermetropia korrekció-, amblyopia kontroll, myopia
- 11 év - hypermetropia korrekció-, amblyopia kontroll, myopia, színlátás
- 14 év - myopia, színlátás (középiskolai beiskolázás, pályaválasztás)
- 16 év - myopia, színlátás

Módszertan



1. Korcsoportnak megfelelő vizsgálótábla /optotyp/ kiválasztása
2. A vizsgálótávolság pontos kimérése, a vizsgáló és a vizsgált személy helyének meghatározása
3. A megfelelő fényviszonyok biztosítása (800 – 1000 Lux, káprázás kiküszöbölése)
4. Cornea reflex helyzetének meghatározása (centrális – excentrikus)
5. Motilitas /szemmozgás vizsgálat: – jobbra, balra, fel, le és befelé nézési képesség vizsgálata a zseblámpa fényének követésével/
6. Cover test /takarásos teszt: - a szemek váltott takarása a latens (rejtett) kancsalság felfedésért
7. Az okkluder felhelyezése a bal szemre (mindig a jobb szemmel kezdjük a vizsgálatot)
8. A vizsgáló a kijelölt helyre áll és elkezdi az optotypok (olvasójelek) mutatását a legnagyobb jeltől a legkisebb jelig. A sorozatjelek olvastatása fontos, de nem kell minden jelet végig mondatni, hanem 1-1 jelet a sorozat közepén.
9. A vizsgálat (cornea reflex, motilitás) eredményét mindig tüntessük fel a szűrés táblázatban.
10. Ahogy a szem (mindkét) látásteljesítményét /Visus/ felmértük /megolvastattuk a páciens/ beírjuk a kapott eredményt a szűrés táblázatba.
11. A színlátás vizsgálatot 5. és 8. osztályos korban kötelező végezni az Ishihara táblával.
12. A familiáris anamnézisre mindig kérdezzünk rá! (van-e kancsal, tompalátó, szemüveges a családban, koraszülött volt-e)