


A látásteljesítmény fejlődő-képessége a kor függvényében



A látásteljesítmény fejlődő-képessége a kor függvényében

A látásszűrés optimális (nemzetközileg kialakított) időpontjai:

- 28 hónap - fejlődési rendellenesség, kancsalság, tompalátóság, hypermetropia, anisometropia
- 4 év - kancsalság, tompalátóság, anisometropia hypermetropia, myopia
- 6 év - kancsalság, tompalátóság, anisometropia hypermetropia, myopia
- 9 év - hypermetropia korrekció-, amblyopia kontroll, myopia
- 11 év - hypermetropia korrekció-, amblyopia kontroll, myopia, színlátás

- 16 év - myopia, színlátás

A látásszűrés optimális időpontjai Magyarországon:

- 28 hónap - fejlődési rendellenesség, kancsalság, tompalátóság, hypermetropia, anisometropia
- 4 év - kancsalság, tompalátóság, anisometropia hypermetropia, myopia
- 6 év - kancsalság, tompalátóság, anisometropia hypermetropia, myopia
- 9 év - hypermetropia korrekció-, amblyopia kontroll, myopia
- 11 év - hypermetropia korrekció-, amblyopia kontroll, myopia, színlátás
- 14 év - myopia, színlátás (középiskolai beiskolázás, pályaválasztás)
- 16 év - myopia, színlátás

